



# О ТУБЕРКУЛЕЗЕ

## Ранний период первичной туберкулезной инфекции.

Первые 6—12 мес от момента заражения туберкулезом, в течение которых риск развития заболевания наиболее высок.

## Симптомы туберкулеза у детей



**У детей туберкулез** обычно начинается с появления слабости, они перестают прибавлять в весе, становятся раздражительными. Если ребенок учится в школе, то он устает от занятий больше, чем здоровые дети, делается рассеянным и нередко начинает отставать в учебе.

Если ему измерять температуру, то можно отметить небольшое ее повышение (до 37,5 °С, а иногда и выше). У таких детей наблюдается также увеличение лимфатических узлов. Туберкулиновые пробы у них положительные. Все эти признаки начавшегося заболевания туберкулезом обуславливаются тем, что туберкулезные палочки, попадая в организм и оседая в лимфатических узлах, выделяют яды (токсины), которые и оказывают вредное действие на организм.

**Основной формой туберкулеза у детей** - является хроническая туберкулезная интоксикация. Дети часто болеют именно этой формой туберкулеза.

Если внимательно следить за ребенком, вовремя уловить малозаметные вначале признаки болезни и своевременно обеспечить соответствующее лечение, организм ребенка обычно хорошо справляется с этим заболеванием.

**Диагноз.** Основным методом диагностики является постановка туберкулиновой пробы. В условиях массовой внутрикожной вакцинации БЦЖ туберкулиновая проба выявляет как инфекционную, так и поствакцинальную аллергию.

**Лечение.** Санаторный режим. Антибактериальная терапия, общеукрепляющие мероприятия, лечебная физкультура.

**Первичный комплекс.** Представляет собой очаг специфического воспаления, возникший на месте внедрения микобактерий туберкулеза (чаще всего в легком) с развитием лимфангита и поражением регионарных лимфатических узлов.